

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

NuvaRing®, 0,120 mg/0,015 mg ogni 24 ore,

**dispositivo vaginale
Etonogestrel/Etinilestradiolo**

Cose importanti da sapere sui contraccettivi ormonali combinati (COC):

- Sono uno dei metodi contraccettivi reversibili più affidabili, se usati correttamente.
- Aumentano leggermente il rischio che si formino coaguli sanguigni nelle vene e nelle arterie, specialmente durante il primo anno di assunzione o quando si riprende un contraccettivo ormonale combinato dopo una pausa di 4 o più settimane.
- Faccia attenzione e si rivolga al medico se pensa di avere i sintomi di un coagulo sanguigno (vedere paragrafo 2 "Coaguli sanguigni").

Legga attentamente questo foglio prima di usare NuvaRing perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è NuvaRing e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare NuvaRing
3. Come usare NuvaRing
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare NuvaRing e il NuvaRing Applicatore
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è NuvaRing e a cosa serve

NuvaRing è un anello vaginale contraccettivo usato per prevenire la gravidanza. Ogni anello contiene una piccola quantità di due ormoni sessuali femminili – etonogestrel e etinilestradiolo. L'anello rilascia lentamente questi ormoni nel circolo sanguigno. Poiché le quantità di ormoni rilasciate sono basse, NuvaRing viene considerato un contraccettivo ormonale a basso dosaggio. Dal momento che NuvaRing rilascia due diversi tipi di ormoni, è un contraccettivo ormonale di tipo cosiddetto combinato.

NuvaRing funziona proprio come una pillola contraccettiva combinata (la Pillola) ma invece di prendere una pillola ogni giorno, l'anello viene usato per 3 settimane di seguito. NuvaRing rilascia due ormoni sessuali femminili che prevengono il rilascio di una cellula uovo dalle ovaie. Se non vi è rilascio di cellule uovo, non è possibile rimanere incinta.

2. Cosa deve sapere prima di usare NuvaRing

Note generali

Prima di iniziare a usare NuvaRing deve leggere le informazioni sui coaguli sanguigni al paragrafo 2. È particolarmente importante che legga i sintomi di un coagulo sanguigno – vedere paragrafo 2 "Coaguli sanguigni".

In questo foglio illustrativo sono descritte diverse situazioni nelle quali è necessario interrompere l'uso di NuvaRing o nelle quali NuvaRing può risultare meno affidabile. In tali situazioni non deve avere rapporti sessuali o deve adottare precauzioni contraccettive aggiuntive non ormonali – come l'uso del preservativo maschile o di altro metodo di barriera. **Non** usi i metodi del ritmo e della temperatura basale, che possono risultare inaffidabili, poiché NuvaRing altera le variazioni mensili della temperatura corporea e

del muco cervicale.

NuvaRing, come altri contraccettivi ormonali, non protegge nei confronti dell'infezione da HIV (AIDS) o di qualunque altra malattia a trasmissione sessuale.

2.1 Non usi NuvaRing

Non usi NuvaRing se presenta una delle condizioni elencate sotto. Se presenta una qualsiasi delle condizioni elencate sotto, si rivolga al medico. Il medico discuterà con lei degli altri metodi di controllo delle nascite che potrebbero essere più adatti al suo caso.

- se ha (o ha mai avuto) un coagulo sanguigno in un vaso della gamba (trombosi venosa profonda, TVP), del polmone (embolia polmonare, EP) o di altri organi;
- se sa di avere un disturbo che colpisce la coagulazione del sangue - come carenza di proteina C, carenza di proteina S, carenza di antitrombina-III, fattore V di Leiden o anticorpi antifosfolipidi;
- se deve sottoporsi a un'operazione o se starà coricata per un lungo periodo (vedere paragrafo "Coaguli sanguigni");
- se ha mai avuto un attacco cardiaco o un ictus;
- se ha (o ha mai avuto) un'angina pectoris (una condizione che causa un forte dolore al torace e che può rappresentare un primo segno di attacco cardiaco) o un attacco ischemico transitorio (TIA - sintomi di ictus temporaneo);
- se ha una delle seguenti malattie, che potrebbe aumentare il rischio che si formino coaguli nelle arterie:
 - diabete grave con lesione dei vasi sanguigni
 - pressione arteriosa molto alta
 - livello molto alto di grassi (colesterolo o trigliceridi) nel sangue
 - una malattia nota come iperomocistinemia
- se ha (o ha mai avuto) un tipo di emicrania chiamata "emicrania con aura";
- se ha (o ha avuto) infiammazione al pancreas (pancreatite) associata ad alti livelli di grassi nel sangue;
- se ha (o ha avuto) una grave malattia del fegato e la funzionalità del fegato non si è ancora normalizzata;
- se ha (o ha avuto) un tumore benigno o maligno al fegato;
- se ha (o ha avuto), o potrebbe avere, un tumore al seno o agli organi genitali;
- se ha emorragia vaginale di origine sconosciuta;
- se è allergica all'etinilestradiolo o all'etonogestrel o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Se una qualunque di queste condizioni compare per la prima volta durante l'uso di NuvaRing, rimuova immediatamente l'anello e consulti il medico. Nel frattempo, usi metodi contraccettivi non ormonali.

Non usi NuvaRing se ha l'epatite C e se sta assumendo medicinali contenenti ombitasvir/paritaprevir/ritonavir e dasabuvir o glecaprevir/pibrentasvir (vedere anche paragrafo 2.4 "Altri medicinali e NuvaRing").

2.2 Avvertenze e precauzioni

**Quando deve rivolgersi a un medico?
Si rivolga urgentemente a un medico**

- se osserva segni possibili di un coagulo sanguigno che possono indicare che soffre di un coagulo sanguigno nella gamba (trombosi venosa profonda), di un coagulo sanguigno nel polmone (embolia polmonare), di un attacco cardiaco o di un ictus (vedere il paragrafo seguente "Coaguli sanguigni").

Per una descrizione dei sintomi di questi gravi effetti indesiderati vada al paragrafo "Come riconoscere un coagulo sanguigno".

Informi il medico se una qualsiasi delle seguenti condizioni si applica al suo caso.

Se questa condizione compare o peggiora mentre sta usando NuvaRing, deve informare il medico.

- se un familiare prossimo ha, o ha mai avuto, un tumore al seno;
- se soffre di epilessia (vedere paragrafo 2.4: "Altri medicinali e NuvaRing");
- se ha una malattia del fegato (ad esempio, ictero) o della colecisti (ad esempio, calcoli biliari);
- se ha la malattia di Crohn o la colite ulcerosa (malattia intestinale infiammatoria cronica);
- se ha il lupus eritematoso sistemico (LES - una malattia che colpisce il sistema di difese naturali);
- se ha la sindrome emolitica uremica (SEU - un disturbo della coagulazione del sangue che causa insufficienza renale);
- se ha l'anemia falciforme (una malattia ereditaria dei globuli rossi);
- se ha livelli elevati di grassi nel sangue (ipertrigliceridemia) o un'anamnesi familiare positiva per tale condizione. L'ipertrigliceridemia è stata associata a un maggior rischio di sviluppare pancreatiti (infiammazioni del pancreas);
- se deve sottoporsi a un'operazione o se starà coricata per un lungo periodo (vedere paragrafo 2 "Coaguli sanguigni");
- se ha appena partorito, il suo rischio di sviluppare coaguli sanguigni è maggiore. Chieda al medico quanto tempo dopo il parto può iniziare a usare NuvaRing;
- se ha un'infiammazione alle vene poste sotto la pelle (tromboflebite superficiale);
- se ha le vene varicose;
- se ha una condizione che si è verificata per la prima volta, oppure è peggiorata, durante la gravidanza o durante un precedente utilizzo di ormoni sessuali (ad es., perdita dell'uditivo, porfiria [una malattia del sangue], herpes gestationis [rash cutaneo con vescicole durante la gravidanza], o corea di Sydenham [una malattia dei nervi in cui possono manifestarsi movimenti improvvisi del corpo], angioedema ereditario);
- se manifesta sintomi di angioedema come gonfiore del viso, della lingua e/o della gola e/o difficoltà a deglutire o orticaria potenzialmente con difficoltà respiratorie, contatti immediatamente un medico. I prodotti contenenti estrogeni possono causare o peggiorare i sintomi dell'angioedema ereditario e acquisito;
- se ha (o ha mai avuto) cloasma (chiazze a pigmentazione marrone-giallognola, cosiddette "chiazze della gravidanza", in particolare sul viso). In tal caso, eviti l'esposizione prolungata al sole o ai raggi ultravioletti;
- se ha una condizione medica che rende difficile l'uso di NuvaRing – ad esempio, stitichezza, prolasso della cervice uterina o dolore durante un rapporto sessuale;
- se ha necessità di urinare urgentemente, frequentemente, con bruciore e/o dolore, e non riesce a localizzare l'anello nella vagina. Questi sintomi possono indicare un posizionamento accidentale di NuvaRing all'interno della vescica.

COAGULI SANGUIGNI

L'uso di un contraccettivo ormonale combinato come NuvaRing causa un aumento del rischio di sviluppare un coagulo sanguigno rispetto al non utilizzo. In rari casi un coagulo sanguigno può bloccare i vasi sanguigni e causare problemi gravi.

I coaguli sanguigni possono svilupparsi

- nelle vene (condizione chiamata "trombosi venosa", "tromboembolia venosa" o TEV);
- nelle arterie (condizione chiamata "trombosi arteriosa", "tromboembolia arteriosa" o TEA).

La guarigione dai coaguli sanguigni non è sempre completa. Raramente, si possono verificare

effetti gravi di lunga durata o, molto raramente, tali effetti possono essere fatali.

È importante ricordare che il rischio globale di un coagulo sanguigno dannoso associato a NuvaRing è basso.

COME RICONOSCERE UN COAGULO SANGUIGNO

Si rivolga immediatamente a un medico se nota uno qualsiasi dei seguenti segni o sintomi.

Presenta uno di questi segni?	Di cosa soffre probabilmente?		
<ul style="list-style-type: none"> gonfiore a una gamba o lungo una vena della gamba o del piede, specialmente se accompagnato da: <ul style="list-style-type: none"> dolore o sensibilità alla gamba che può essere avvertito solo in piedi o camminando maggior sensazione di calore nella gamba colpita variazione del colore della pelle della gamba, come pallore, colorazione rossastra o bluastra 	Trombosi venosa profonda	<ul style="list-style-type: none"> dolore, fastidio, sensazione di pressione o di pesantezza al torace sensazione di schiacciamento o di pienezza al torace, a un braccio o sotto lo sterno; sensazione di pieenezza, indigestione o soffocamento; fastidio alla parte superiore del corpo, che si irradia a schiena, mascella, gola, braccia e stomaco; sudorazione, nausea, vomito o capogiri; estrema debolezza, ansia o mancanza di respiro; battiti cardiaci accelerati o irregolari 	Attacco cardiaco
<ul style="list-style-type: none"> mancanza di respiro o respirazione accelerata improvvisi e inspiegati; tosse improvvisa senza una causa evidente, con possibile emissione di sangue; dolore acuto al torace che può aumentare quando si respira profondamente; stordimento grave o capogiri; battito cardiaco accelerato o irregolare; forte dolore allo stomaco <p>Se non è sicura, informi il medico in quanto alcuni di questi sintomi come la tosse o la mancanza di respiro possono essere scambiati per una condizione più lieve come un'infezione delle vie respiratorie (ad es., un "comune raffreddore").</p>	Embolia polmonare	<ul style="list-style-type: none"> intorpidimento o debolezza improvvisa del viso, di un braccio o di una gamba, soprattutto su un lato del corpo; improvvisa confusione, difficoltà a parlare o a comprendere; improvvisa difficoltà a vedere con uno o con entrambi gli occhi; improvvisa difficoltà a camminare, capogiri, perdita dell'equilibrio o della coordinazione; improvvisa emicrania, grave o prolungata, senza causa nota; perdita di conoscenza o svenimento con o senza convulsioni. <p>Talvolta i sintomi di ictus possono essere brevi, con un recupero quasi immediato e completo, ma deve comunque rivolgersi urgentemente a un medico in quanto potrebbe essere a rischio di un altro ictus.</p>	ictus
Sintomi che si verificano più frequentemente in un occhio: <ul style="list-style-type: none"> perdita immediata della vista o offuscamento indolore della vista che può progredire a perdita della vista 	Trombosi della vena retinica (coagulo sanguigno nell'occhio)	<ul style="list-style-type: none"> gonfiore e colorazione blu pallida di un'estremità; forte dolore allo stomaco (addome acuto). 	Coaguli sanguigni che bloccano altri vasi sanguigni

COAGULI SANGUIGNI IN UNA VENA

Cosa può accadere se si forma un coagulo sanguigno in una vena?

- L'uso di contraccettivi ormonali combinati è stato correlato a un aumento del rischio di formazione di coaguli sanguigni nelle vene (trombosi venosa). Questi effetti collaterali, però, sono rari. Nella maggior parte dei casi essi si verificano nel primo anno di utilizzo di un contraccettivo ormonale combinato.
- Se un coagulo sanguigno si forma in una vena della gamba o del piede, può causare una trombosi venosa profonda (TVP).
- Se un coagulo sanguigno si sposta dalla gamba e si colloca nel polmone, può causare un'embolia polmonare.
- Molto raramente il coagulo può formarsi in un altro organo come l'occhio (trombosi della vena retinica).

Quando è massimo il rischio di sviluppare un coagulo sanguigno in una vena?

Il rischio di sviluppare un coagulo sanguigno in una vena è massimo durante il primo anno in cui si assume per la prima volta un contraccettivo ormonale combinato. Il rischio può essere anche superiore se si ricomincia ad assumere un contraccettivo ormonale combinato (lo

stesso farmaco o un farmaco diverso) dopo una pausa di 4 o più settimane.

Dopo il primo anno, il rischio si riduce ma è sempre leggermente superiore che se non si stesse utilizzando un contraccettivo ormonale combinato.

Quando si interrompe l'assunzione di NuvaRing, il rischio di sviluppare un coagulo sanguigno torna ai livelli normali entro alcune settimane.

Qual è il rischio di sviluppare un coagulo sanguigno?

Il rischio dipende dal suo rischio naturale di TEV e dal tipo di contraccettivo ormonale combinato che sta assumendo.

Il rischio globale di sviluppare un coagulo sanguigno nella gamba o nel polmone (TVP o EP) con NuvaRing è basso.

- Su 10.000 donne che non usano alcun contraccettivo ormonale combinato e che non sono incinta, circa 2 svilupperanno un coagulo sanguigno in un anno.
- Su 10.000 donne che usano un contraccettivo ormonale combinato che contiene levonorgestrel, noretisterone o norgestimato, circa 5-7 svilupperanno un coagulo sanguigno in un anno.
- Su 10.000 donne che usano un contraccettivo ormonale combinato contenente norelgestromina o etonogestrel, come NuvaRing, circa 6-12 svilupperanno un coagulo sanguigno in un anno.
- Il rischio che si formi un coagulo sanguigno dipende dalla sua anamnesi medica (vedere sotto "Fattori che aumentano il rischio di formazione di un coagulo sanguigno").

Rischio di sviluppare un coagulo sanguigno in un anno	
Donne che non usano una pillola/ un cerotto/un anello ormonale combinato e che non sono in gravidanza	Circa 2 donne su 10.000
Donne che usano una pillola contraccettiva ormonale combinata contenente levonorgestrel, noretisterone o norgestimato	Circa 5-7 donne su 10.000
Donne che usano NuvaRing	Circa 6-12 donne su 10.000

Fattori che aumentano il rischio di sviluppare un coagulo sanguigno in una vena

Il rischio di sviluppare un coagulo sanguigno con NuvaRing è basso ma alcune condizioni ne causano un aumento. Il suo rischio è maggiore:

- se è fortemente sovrappeso (indice di massa corporea o IMC superiore a 30 kg/m²);
- se un suo parente stretto ha avuto un coagulo sanguigno in una gamba, nel polmone o in un altro organo in giovane età (inferiore a circa 50 anni). In questo caso lei potrebbe avere un disturbo ereditario della coagulazione del sangue;
- se deve sottoporsi a un'operazione o se deve restare coricata per un lungo periodo a causa di una lesione o di una malattia o se ha una gamba ingessata. Potrebbe essere necessario interrompere l'assunzione di NuvaRing alcune settimane prima dell'intervento o nel periodo in cui è meno mobile. Se deve interrompere l'assunzione di NuvaRing, chieda al medico quando può iniziare a prenderlo nuovamente;
- quando invecchia (soprattutto oltre 35 anni);
- se ha partorito meno di alcune settimane fa.

Il rischio di sviluppare un coagulo sanguigno aumenta quando lei presenta più condizioni di questo tipo.

I viaggi in aereo (di durata >4 ore) possono

aumentare temporaneamente il rischio che si formi un coagulo sanguigno, soprattutto se lei ha alcuni degli altri fattori di rischio elencati. È importante che informi il medico se una qualsiasi di queste condizioni si applica al suo caso, anche se non ne è sicura. Il medico può decidere di farle interrompere l'assunzione di NuvaRing.

Se una qualsiasi delle condizioni di cui sopra cambia mentre sta usando NuvaRing, ad esempio se un parente stretto presenta una trombosi senza alcun motivo noto o se aumenta molto di peso, contatti il medico.

COAGULI SANGUIGNI IN UN'ARTERIA

Cosa può accadere se si forma un coagulo sanguigno in un'arteria?

Come i coaguli sanguigni in una vena, i coaguli in un'arteria possono causare problemi gravi, ad esempio, possono causare un attacco cardiaco o un ictus.

Fattori che aumentano il rischio di sviluppare un coagulo sanguigno in un'arteria

È importante osservare che il rischio di attacco cardiaco o di ictus associato all'uso di NuvaRing è molto basso ma può aumentare:

- all'aumentare dell'età (oltre 35 anni);
- **se fuma.** Quando usa un contraccettivo ormonale combinato come NuvaRing è consigliabile che smetta di fumare. Se non riesce a smettere di fumare e se ha più di 35 anni, il medico può consigliarle di usare un tipo diverso di contraccettivo;
- se è sovrappeso;
- se ha la pressione sanguigna alta;
- se un suo parente stretto ha avuto un attacco cardiaco o un ictus in giovane età (inferiore a circa 50 anni). In questo caso potrebbe anche lei presentare un rischio elevato di attacco cardiaco o ictus;
- se lei, o un suo parente stretto, ha un livello elevato di grassi nel sangue (colesterolo o trigliceridi);
- se soffre di emicrania, specialmente di emicrania con aura;
- se ha qualche problema al cuore (difetto valvolare, un disturbo del ritmo cardiaco chiamato fibrillazione atriale);
- se ha il diabete.

Se presenta più di una di queste condizioni o se una di esse è particolarmente grave, il rischio di sviluppare un coagulo sanguigno può essere ancora superiore.

Se una qualsiasi delle condizioni di cui sopra cambia mentre sta usando NuvaRing, ad esempio se inizia a fumare, se un parente stretto presenta una trombosi senza alcun motivo noto o se aumenta molto di peso, contatti il medico.

Tumori

Le informazioni riportate di seguito sono state ottenute in studi sui contraccettivi orali combinati e possono essere applicate anche a NuvaRing. Non sono disponibili informazioni sulla somministrazione vaginale di ormoni contraccettivi (come NuvaRing).

Le diagnosi di tumore del seno sono lievemente più frequenti nelle donne che usano la pillola combinata, ma non è noto se ciò sia causato dal trattamento. Ad esempio, può essere che i tumori siano riscontrati di più nelle donne in trattamento con la pillola combinata perché esse sono controllate più frequentemente dal medico. L'aumento del manifestarsi del tumore mammario diminuisce gradualmente a seguito dell'interruzione della pillola combinata.

È importante controllare regolarmente il proprio seno e contattare il medico appena si sente un nodulo. Inoltre è necessario riferire al medico se una parente prossima ha o ha avuto un tumore mammario (vedere paragrafo 2.2 "Avvertenze e precauzioni").

Nelle donne che assumono la pillola sono stati riportati raramente tumori epatici benigni e in un numero ancora minore di casi tumori epatici maligni. Consulti il medico in caso di forti dolori inconsueti all'addome.

Nelle donne che usano la pillola combinata, è stato riportato che il tumore dell'endometrio (il rivestimento interno dell'utero) ed il tumore delle ovaie si verificano meno frequentemente. Ciò può essere anche il caso di NuvaRing ma non è stato confermato.

Disturbi psichiatrici

Alcune donne che usano contraccettivi ormonali tra cui NuvaRing hanno segnalato depressione o umore depresso. La depressione può essere grave e a volte può portare a pensieri suicidari. Se si verificano cambiamenti d'umore e sintomi depressivi, si rivolga al più presto al medico per ricevere ulteriori consigli medici.

2.3 Bambini e adolescenti

La sicurezza e l'efficacia di NuvaRing nelle adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state studiate.

2.4 Altri medicinali e NuvaRing

Informi sempre il medico sui medicinali o prodotti a base di erbe che sta già prendendo. Informi anche tutti gli altri medici o dentisti (o il farmacista) che prescrivono altri medicinali del fatto che sta usando NuvaRing. Possono dirle se ha bisogno di usare metodi contraccettivi aggiuntivi (ad esempio, un preservativo maschile) e in questo caso, per quanto tempo, o se sia necessario modificare l'impiego di un altro medicinale che sta assumendo.

Alcuni medicinali

- possono influire sui livelli ematici di NuvaRing;
- possono determinare una **diminuzione dell'efficacia contraccettiva**;
- possono provocare sanguinamenti inattesi.

Tra questi vi sono i medicinali usati per trattare:

- l'epilessia (ad es., primidone, fenitoina, barbiturici, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, felbamato);
- la tubercolosi (ad es., rifampicina);
- l'infezione da HIV (ad es., ritonavir, nelfinavir, nevirapina, efavirenz);
- l'infezione da virus dell'epatite C (ad es., boceprevir, telaprevir);
- altre malattie infettive (ad es., griseofulvina);
- la pressione alta del sangue nei vasi sanguigni dei polmoni (bosentan);
- l'umore depresso (rimedio a base di erba di S. Giovanni).

Se sta assumendo medicinali o prodotti a base di erbe che possono portare ad una riduzione dell'efficacia di NuvaRing, deve usare anche un metodo contraccettivo di barriera (ad esempio, un preservativo maschile). Poiché l'effetto di altri medicinali su NuvaRing può durare fino a 28 giorni dopo la loro interruzione, è necessario utilizzare un ulteriore metodo contraccettivo di barriera per tutto questo periodo. Nota: Non usi NuvaRing in associazione ad un diaframma, un cappuccio cervicale o un preservativo femminile.

NuvaRing può influenzare l'effetto di altri medicinali, ad es.

- medicinali contenenti ciclosporina
- l'antiepilettico lamotrigina (questo potrebbe portare ad un aumento della frequenza delle convulsioni)

Non usi NuvaRing se ha l'epatite C e se sta assumendo medicinali contenenti ombitasvir/paritaprevir/ritonavir e dasabuvir o glicoprevir/pibrentasvir poiché ciò può causare aumenti dei valori degli esami del sangue per la funzionalità del fegato (aumento degli enzimi epatici ALT).

Il medico le prescriverà un altro tipo di contraccettivo prima dell'inizio del trattamento con questi medicinali.

NuvaRing può essere ripreso approssimativamente 2 settimane dopo la fine di tale trattamento. Vedere paragrafo 2.1 "Non usi NuvaRing".

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Può usare tamponi assorbenti durante l'uso di NuvaRing. Inserisca NuvaRing prima di inserire

il tampone. È necessario porre particolare attenzione nella rimozione del tampone per essere sicura che l'anello non venga accidentalmente espulso. Se ciò dovesse verificarsi, lavi semplicemente l'anello in acqua fredda o tiepida e lo reinserisca immediatamente.

Si è verificata rottura dell'anello quando si è utilizzato anche un prodotto vaginale come un lubrificante o un trattamento antinfettivo (vedere paragrafo 3.4 "Cosa fare se... L'anello si rompe"). L'uso di prodotti spermicidi o a base di lieviti vaginali non riduce l'efficacia contraccettiva di NuvaRing.

Esami di laboratorio

Se si sottopone a esami del sangue o delle urine, informi l'operatore sanitario che sta usando NuvaRing poiché esso può alterare i risultati di alcuni esami.

2.5 Gravidanza e allattamento

NuvaRing non deve essere usato in caso di gravidanza accertata o presunta. Se dovesse instaurarsi una gravidanza mentre sta usando NuvaRing, deve rimuovere l'anello e contattare il medico.

Se vuole interrompere l'uso di NuvaRing perché vuole iniziare una gravidanza, veda il paragrafo 3.5 "Quando si vuole interrompere l'uso di NuvaRing".

NuvaRing non è di solito raccomandato durante l'allattamento al seno. Se desidera usare NuvaRing durante l'allattamento al seno, chieda il parere del medico.

2.6 Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

È improbabile che NuvaRing abbia effetti sulla capacità di guidare o usare macchinari.

3. Come usare NuvaRing

Lei stessa può inserire e rimuovere NuvaRing. Il medico le fornirà le istruzioni su quando iniziare ad usare NuvaRing per la prima volta. L'anello vaginale deve essere inserito nel giorno appropriato del ciclo mestruale (vedere paragrafo 3.3 "Quando iniziare con il primo anello") e lasciato in vagina per 3 settimane di seguito. Controlli regolarmente che NuvaRing sia in vagina (ad esempio, prima e dopo un rapporto sessuale) per assicurare protezione dalla gravidanza. Dopo la terza settimana, tolga NuvaRing e faccia una settimana di intervallo. Di solito il ciclo mestruale si presenterà durante questo intervallo libero da anello.

Durante l'utilizzo di NuvaRing, non deve usare alcuni metodi contraccettivi di barriera femminili, come un diaframma vaginale, un cappuccio cervicale o un preservativo femminile. Questi metodi contraccettivi di barriera non devono essere usati come metodo aggiuntivo per il controllo delle nascite, in quanto NuvaRing può interferire con la corretta collocazione e posizione del diaframma, del cappuccio cervicale o del preservativo femminile. Tuttavia, può utilizzare un preservativo maschile come metodo contraccettivo di barriera aggiuntivo.

3.1 Come inserire e rimuovere NuvaRing

1. Prima di inserire l'anello controlli che non sia scaduto (vedere paragrafo 5 "Come conservare NuvaRing e il NuvaRing Applicatore").
2. Si lavi le mani prima di inserire o rimuovere l'anello.
3. Scelga la posizione a lei più comoda per inserire l'anello, ad esempio stando in piedi con una gamba alzata, accovacciata o sdraiata.
4. Rimuova NuvaRing dalla sua bustina.
5. Tenga l'anello tra il pollice e l'indice, comprimendolo ai lati opposti e lo inserisca nella vagina (vedere Figure 1-4). In alternativa, può scegliere di usare il NuvaRing Applicatore per aiutarla ad inserire l'anello (vedere sotto Istruzioni per l'uso). Una volta che NuvaRing inserito è al suo posto non dovrebbe sentire nessun fastidio. Se avverte invece una sensazione fastidiosa, cambi delicatamente la posizione di NuvaRing (ad es.,

- spinga l'anello un pò più in profondità nella vagina) fino a sentire l'anello in posizione confortevole. L'esatta posizione dell'anello all'interno della vagina non è importante.
- Dopo 3 settimane, rimuova NuvaRing dalla vagina. NuvaRing può essere rimosso agganciando con il dito indice il bordo anteriore dell'anello oppure afferrando il bordo dell'anello e tirando verso l'esterno (vedere Figura 5). Se ha inserito l'anello in vagina, ma ha difficoltà a rimuoverlo, deve necessariamente contattare il medico.
 - L'anello usato deve essere gettato insieme ai normali rifiuti domestici, preferibilmente all'interno della bustina richiudibile. Non getti NuvaRing nel water.

Come inserire NuvaRing solo con le dita:



Figura 1
Prelevi NuvaRing dalla bustina



Figura 2
Comprima l'anello




Figura 3
Sceglie una posizione comoda per inserire l'anello



Figura 4A
Figura 4C

Inserisce l'anello nella vagina con una mano (Figura 4A), se necessario, le labbra possono essere divaricate con l'altra mano. Spinga l'anello nella vagina fino a sentire l'anello in posizione confortevole (Figura 4B). Lasci l'anello inserito per 3 settimane (Figura 4C).





Figura 5
NuvaRing può essere rimosso agganciando il dito indice sotto l'anello oppure afferrando l'anello tra il dito indice e il medio e tirando verso l'esterno.

Informazioni importanti per il NuvaRing Applicatore:


- Ad uso facoltativo per aiutare ad inserire NuvaRing.
- NON riutilizzi l'applicatore; è progettato per essere utilizzato una sola volta.
- NON condivida l'applicatore con altri.
- Nel caso in cui l'applicatore cada accidentalmente, lavi con acqua fredda o tiepida (NON calda).
- Smaltisca l'applicatore in un normale contenitore per rifiuti immediatamente dopo l'utilizzo.
- Non getti l'applicatore nel water.

Come inserire NuvaRing con l'applicatore:


1: Preparazione



Lavi le mani prima di aprire la confezione. Apri SOLO immediatamente prima dell'uso. NON usi se i contenuti o la confezione sono visibilmente danneggiati.




L'applicatore va usato SOLO con NuvaRing anello vaginale, non con altri prodotti.




Esamina l'illustrazione dell'applicatore per familiarizzare con i componenti dell'applicatore.

A. Stantuffo
B. Impugnatura
C. Cannula
D. Apertura della Cannula
E. NuvaRing


2: Caricamento e Posizionamento




Tiri indietro lo stantuffo con delicatezza fino a quando non si blocca.



Comprima i lati opposti dell'anello insieme e inserisca l'anello nell'apertura della cannula.




Spinga con delicatezza l'anello nella cannula. La punta dell'anello deve sporgere leggermente dall'apertura della cannula.



Sceglie la posizione a lei più comoda per inserire l'anello, ad esempio sdraiata, accovacciata o stando in piedi con una gamba alzata.

3: Inserimento e Smaltimento




Posiziona il pollice ed il dito medio sull'impugnatura.




Inserisce con delicatezza la cannula nella vagina fino a quando le dita (sull'impugnatura) toccano il corpo. Quindi usi il dito indice per spingere con delicatezza lo stantuffo dentro la cannula.

Alcune donne hanno avvertito una breve sensazione di lieve pizzicore quando si utilizza l'applicatore.



L'anello viene spinto fuori dall'applicatore. Rimuova con delicatezza l'applicatore.



Si accerti che l'anello NON sia nell'applicatore. Smaltisca l'applicatore usato in un normale contenitore per rifiuti. NON getti l'applicatore nel water. NON riutilizzi l'applicatore.

3.2 Tre settimane con l'anello inserito, una settimana senza

- Iniziando con il giorno in cui viene inserito, l'anello vaginale deve essere tenuto in vagina senza interruzione per 3 settimane.
- Dopo 3 settimane, rimuova l'anello lo stesso giorno della settimana in cui è stato inserito, approssimativamente alla stessa ora. Ad esempio, se inserisce NuvaRing il mercoledì intorno alle ore 22, deve rimuovere l'anello il mercoledì della terza settimana successiva, all'incirca alle ore 22.
- Dopo la rimozione, non usi l'anello per 1 settimana. Durante questa settimana, dovrebbe manifestarsi un sanguinamento vaginale. Di solito esso inizia 2-3 giorni dopo la rimozione di NuvaRing.
- Inizi con un nuovo anello esattamente dopo l'intervallo di 1 settimana (di nuovo lo stesso giorno della settimana ed approssimativamente alla stessa ora), anche se l'emorragia vaginale non è ancora finita.

Se il nuovo anello viene inserito con un ritardo superiore a 3 ore, la protezione dalla gravidanza può essere ridotta. In tal caso, seguì le istruzioni fornite nel paragrafo 3.4 *"Cosa fare se... Si dimentica di inserire un nuovo anello dopo un intervallo libero da anello"*.

Se usa NuvaRing come descritto sopra, il sanguinamento vaginale avverrà ogni mese all'incirca negli stessi giorni.

3.3 Quando iniziare con il primo anello

- Se non ha usato un contraccettivo ormonale durante l'ultimo mese

Inserisce il primo NuvaRing il 1° giorno del suo ciclo naturale (cioè il primo giorno del ciclo mestruale). NuvaRing inizia a esercitare il suo effetto immediatamente. Non è necessario adottare altre misure contraccettive.

Può iniziare NuvaRing anche tra il giorno 2 e il giorno 5 ma, se ha rapporti sessuali nei primi 7 giorni di uso di NuvaRing, si assicuri di utilizzare anche un ulteriore metodo contraccettivo (come un preservativo maschile). Deve seguire questo consiglio solo quando usa NuvaRing per la prima volta.

- Se ha usato una pillola combinata durante l'ultimo mese

Inizi ad utilizzare NuvaRing al più tardi il giorno seguente l'intervallo libero da pillola della sua attuale pillola. Se la confezione contiene anche compresse inattive, inizi ad usare NuvaRing al più tardi il giorno seguente l'ultima compressa inattiva. Se non è sicura quale sia, consulti il medico o il farmacista. Non prolunghi mai l'intervallo libero da ormoni dell'attuale confezione di pillole oltre la sua lunghezza raccomandata.

Se ha usato la pillola costantemente e correttamente e se è sicura di non essere incinta, può anche interrompere l'assunzione della pillola in qualunque giorno della confezione attuale ed iniziare ad usare NuvaRing immediatamente.

- Se ha usato un cerotto transdermico durante l'ultimo mese

Inizi ad usare NuvaRing al più tardi il giorno seguente il solito intervallo libero da cerotto. Non prolunghi mai l'intervallo libero da cerotto oltre il periodo di tempo raccomandato. Se ha usato il cerotto costantemente e correttamente e se è sicura di non essere incinta, può anche interrompere l'uso del cerotto in qualunque giorno ed iniziare ad usare NuvaRing immediatamente.

- Se ha usato una minipillola (pillola a base di solo progestinico) durante l'ultimo mese

Può interrompere la minipillola in qualsiasi giorno ed iniziare a usare NuvaRing il giorno dopo alla stessa ora in cui avrebbe normalmente preso la pillola. Si assicuri di utilizzare anche un ulteriore metodo contraccettivo (come un preservativo maschile) nei primi 7 giorni di uso dell'anello.

- **Se ha usato un'iniezione o un impianto o un dispositivo intrauterino (IUD) che rilascia progestinico durante l'ultimo mese**
Inizi ad utilizzare NuvaRing il giorno in cui è prevista la nuova iniezione oppure il giorno della rimozione dell'impianto o dello IUD che rilascia progestinico. Si assicuri di utilizzare anche un ulteriore metodo contraccettivo (come un preservativo maschile) nei primi 7 giorni di uso dell'anello.
- **Dopo un parto**
Se ha appena avuto un bambino, il medico le dirà di attendere il suo primo ciclo naturale prima di iniziare ad usare NuvaRing. In alcuni casi è possibile iniziare prima. Chieda consiglio al medico. Se vuole utilizzare NuvaRing durante il periodo dell'allattamento al seno, deve consultare prima il medico.
- **Dopo aborto naturale o chirurgico**
Consulti il medico.

3.4 Cosa fare se...

L'anello viene espulso accidentalmente dalla vagina

NuvaRing può accidentalmente fuoriuscire dalla vagina – ad esempio, se non è stato inserito correttamente, durante la rimozione di un tampone assorbente, durante un rapporto sessuale, in concomitanza con stitichezza o prolacco dell'utero. Pertanto, deve controllare regolarmente se l'anello è ancora in vagina (ad esempio, prima e dopo un rapporto sessuale).

L'anello rimane temporaneamente al di fuori della vagina

NuvaRing può continuare ancora a proteggerla dalla gravidanza, ma ciò dipende da quanto tempo rimane al di fuori della vagina.

Se l'anello rimane al di fuori della vagina per:

- un periodo **inferiore a 3 ore**, può ancora proteggerla dalla gravidanza. Deve lavare l'anello in acqua fredda o tiepida (non usi acqua calda) e reinserire l'anello prima possibile, ma solo se l'anello è rimasto al di fuori della vagina per meno di 3 ore.
- un periodo **superiore a 3 ore durante la 1^a e la 2^a settimana**, può non proteggerla dalla gravidanza. Deve lavare l'anello in acqua fredda o tiepida (non usi acqua calda) e reinserire comunque l'anello non appena si ricorda di farlo, e lasciare l'anello in vagina senza interruzione per almeno 7 giorni. Usi un preservativo maschile se ha rapporti sessuali durante questi 7 giorni. Se è nella 1^a settimana e ha avuto rapporti sessuali nei 7 giorni precedenti, c'è una possibilità che si sia instaurata una gravidanza. In tal caso, contatti il medico.
- un periodo **superiore a 3 ore durante la 3^a settimana**, può non proteggerla dalla gravidanza. Deve gettare quell'anello e scegliere una delle seguenti due opzioni:
 - 1) Inserisca immediatamente un nuovo anello.
Ciò darà inizio al successivo periodo di impiego di tre settimane. Il ciclo mestruale può non comparire, ma possono verificarsi sanguinamento e spotting da sospensione.
 - 2) Non inserisca di nuovo l'anello. Aspetti di avere prima il suo ciclo mestruale ed inserisca un nuovo anello non oltre 7 giorni dal momento in cui il precedente anello è stato rimosso o è fuoriuscito.
Deve scegliere questa opzione solo se ha usato NuvaRing in modo continuativo nei 7 giorni precedenti.
- un periodo di tempo non noto, può non essere protetta dalla gravidanza. Esegua un test di gravidanza e consulti il medico prima dell'inserimento di un nuovo anello.

L'anello si rompe

Molto raramente NuvaRing può rompersi. È stata segnalata lesione vaginale associata alla rottura dell'anello. Se nota che NuvaRing si è rotto, elimini quell'anello ed inizi con un nuovo anello appena possibile. Usi precauzioni con-

traccettive aggiuntive (ad es., un preservativo maschile) nei successivi 7 giorni. Se ha avuto rapporti sessuali prima di aver notato la rottura dell'anello, consulti il medico.

Si è inserito più di un anello

Non sono stati riportati effetti negativi gravi dovuti ad un sovradosaggio degli ormoni di NuvaRing. Nel caso abbia inserito accidentalmente più di un anello, può avere nausea, vomito o emorragia vaginale. Rimuova gli anelli in eccesso e consulti il proprio medico se tali sintomi persistono.

Si dimentica di inserire un nuovo anello dopo un intervallo libero da anello

Se l'intervallo libero da anello è di oltre 7 giorni, inserisca un nuovo anello non appena si ricorda di farlo. Usi un ulteriore metodo contraccettivo (come un preservativo maschile), se ha rapporti sessuali, per i successivi 7 giorni. **Se ha avuto rapporti sessuali durante il periodo d'intervallo libero da anello, deve essere presa in considerazione la possibilità che si sia instaurata una gravidanza.** Ne parli immediatamente con il medico. Più l'intervallo libero da anello è prolungato, maggiore è il rischio di gravidanza.

Si dimentica di rimuovere l'anello

- Se l'anello è rimasto inserito per più di 3 ma non oltre 4 settimane può ancora proteggerla dalla gravidanza. Effettui il regolare intervallo di una settimana libero da anello e poi inserisca un nuovo anello.
- Se l'anello è rimasto inserito per un periodo **superiore a 4 settimane** c'è la possibilità che si instauri una gravidanza. Contatti il medico prima di inserire un nuovo anello.

Si ha una mancata comparsa delle mestruazioni

NuvaRing è stato usato seguendo le istruzioni

Se ha una mancata comparsa delle mestruazioni, ma ha usato NuvaRing seguendo le istruzioni e non ha preso altri medicinali, è molto improbabile che si sia instaurata una gravidanza. Continui l'uso di NuvaRing come d'abitudine. Tuttavia, nel caso in cui le mestruazioni non si presentino per due volte di seguito, è possibile che si sia instaurata una gravidanza. Consulti immediatamente il medico. Non inizi con un nuovo NuvaRing finché il medico non abbia escluso la gravidanza.

NuvaRing non è stato usato seguendo le istruzioni

Se ha una mancata comparsa delle mestruazioni e non ha seguito le istruzioni fornite e durante il primo intervallo normale libero da anello non ha avuto il ciclo atteso, si potrebbe essere instaurata una gravidanza. Consulti il medico prima di iniziare ad usare un nuovo NuvaRing.

Si ha un sanguinamento inatteso

Durante l'uso di NuvaRing, alcune donne possono avere una emorragia vaginale inattesa fra un ciclo e l'altro. Può essere necessario usare una protezione igienica. In ogni caso, lasci l'anello in vagina e continui ad utilizzarlo normalmente. Consulti il medico se l'emorragia irregolare persiste, diventa intensa o si ripresenta.

Si vuole cambiare il primo giorno del proprio ciclo mestruale

Se usa NuvaRing seguendo le istruzioni, il ciclo mestruale (emorragia da sospensione) inizierà nel corso dell'intervallo libero da anello. Se vuole cambiare il giorno di inizio del ciclo, può accorciare l'intervallo libero da anello (mai allungare questo intervallo!).

Ad esempio, se il ciclo mestruale inizia solitamente di venerdì, può cambiare in martedì (3 giorni prima) a partire dal mese successivo. È sufficiente inserire il successivo anello 3 giorni prima del solito.

Se l'intervallo libero da anello è molto breve (ad esempio, 3 giorni o meno), può non avere

il consueto sanguinamento, ma può avere spotting (gocce o macchioline di sangue) o emorragia da rottura durante l'uso dell'anello successivo.

Se non è sicura su come procedere, contatti il medico per chiarimenti.

Si vuole posticipare il proprio ciclo mestruale

Sebbene non sia raccomandato, è possibile posticipare il proprio ciclo mestruale (emorragia da sospensione) inserendo un nuovo anello subito dopo aver rimosso quello precedente, senza effettuare alcun intervallo libero da anello. Il nuovo anello può restare inserito per un periodo massimo di 3 settimane. Durante l'uso del nuovo anello può avere spotting (gocce o macchioline di sangue) o emorragia da rottura. Rimuova l'anello quando decide di avere il ciclo. Rispetti il regolare intervallo libero da anello di una settimana e successivamente inserisca un nuovo anello.

Può chiedere consiglio al medico prima di decidere di ritardare il ciclo mestruale.

3.5 Quando si vuole interrompere l'uso di Nuvaring

Può interrompere l'uso di NuvaRing quando vuole.

Se non desidera gravidanze, consulti il medico per altri metodi di controllo delle nascite.

Se interrompe l'uso di NuvaRing perché desidera una gravidanza, deve attendere il ciclo naturale prima di provare il concepimento. Ciò la aiuterà a calcolare la data di nascita prevista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, NuvaRing può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Se presenta un qualsiasi effetto indesiderato, specialmente se grave o persistente, o se avviene un qualche cambiamento nella sua salute che pensa potrebbe essere dovuto a NuvaRing, informi il medico.

Un maggior rischio di sviluppare coaguli sanguigni nelle vene (tromboembolia venosa (TEV)) o coaguli sanguigni nelle arterie (tromboembolia arteriosa (TEA)) è presente in tutte le donne che prendono contraccettivi ormonali combinati. Per informazioni più dettagliate sui diversi rischi derivanti dall'assunzione di contraccettivi ormonali combinati, vedere paragrafo 2 "Cosa deve sapere prima di usare NuvaRing".

Se è allergica a uno dei componenti di NuvaRing (ipersensibilità) può avere i seguenti sintomi (frequenza non nota): angioedema e/o anafilassi [gonfiore del viso, delle labbra, della lingua e/o della gola e/o difficoltà a deglutire] oppure orticaria potenzialmente con difficoltà respiratoria. Se ciò dovesse verificarsi, rimuova NuvaRing e consulti il medico immediatamente (vedere anche paragrafo 2.2 "Avvertenze e precauzioni").

I seguenti effetti indesiderati sono stati segnalati durante l'uso di NuvaRing.

Comune: può interessare fino a 1 donna su 10

- dolore addominale; sensazione di malessere (nausea)
- micosi vaginale (ad esempio, "Candida"); disturbo vaginale dovuto all'anello; prurito nell'area genitale; secrezione vaginale
- mal di testa o emicrania; umore depresso; diminuzione della libido
- dolore al seno; dolore pelvico; mestruazioni dolorose
- acne
- aumento di peso
- espulsione dell'anello

Non comune: può interessare fino a 1 donna su 100

- disturbi visivi; capogiri
- addome gonfio; vomito, diarrea o stitichezza
- sensazione di stanchezza, malessere o irritabilità; cambiamenti di umore; sbalzi di umore
- eccesso di liquidi nei tessuti (edema)

- infezione del tratto urinario o della vescica
- difficoltà o dolore a urinare; forte desiderio o necessità di urinare; urinare con maggiore frequenza
- problemi durante il rapporto sessuale, tra cui dolore, sanguinamento o sensazione di presenza dell'anello da parte del partner
- aumento della pressione sanguigna
- aumento dell'appetito
- dolore alla schiena; spasmi muscolari; dolore alle gambe o alle braccia
- ridotta sensibilità cutanea
- seno dolente o ingrossato; mastopatia fibro-cistica (cisti del seno che possono gonfiarsi o provocare dolore)
- infiammazione della cervice uterina; polipi cervicali (escrescenze nella cervice); estroflessione del bordo della cervice (ectropion)
- alterazioni del ciclo mestruale (ad es., i cicli possono essere abbondanti, lunghi, irregolari o possono interrompersi del tutto); disturbi nella zona pelvica; sindrome premenstruale; spasmi dell'utero
- infezioni vaginali (fungine e batteriche); bruciore, cattivo odore, dolore, fastidio o secchezza della vagina o della vulva
- caduta di capelli, eczema, prurito, eruzione cutanea o vescica di calore
- orticaria

Raro: può interessare fino a 1 donna su 1.000

- coaguli sanguigni dannosi in una vena o in un'arteria, ad esempio:
 - in una gamba o in un piede (TVP)
 - in un polmone (EP)
 - attacco cardiaco
 - ictus
 - mini-ictus o sintomi temporanei simili a quelli dell'ictus, noti come attacco ischemico transitorio (TIA)
 - coaguli sanguigni nel fegato, nello stomaco/intestino, nei reni o nell'occhio.

La possibilità di sviluppare un coagulo sanguigno può essere superiore se presenta una qualsiasi altra condizione che aumenta tale rischio. (Vedere paragrafo 2 per maggiori informazioni sulle condizioni che aumentano il rischio di coaguli sanguigni e i sintomi di un coagulo sanguigno.)

- secrezione mammaria

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- cloasma (chiazze cutanee a pigmentazione marrone-giallognola, in particolare sul viso)
- fastidio al pene da parte del partner (come irritazione, eruzione cutanea, prurito)
- incapacità a rimuovere l'anello senza assistenza medica (ad es., a causa dell'adesione alla parete vaginale)
- lesione vaginale associata a rottura dell'anello.

In associazione all'uso di contraccettivi ormonali combinati sono stati riportati cancro della mammella e tumore del fegato. Per ulteriori informazioni, vedere paragrafo 2.2 *Avvertenze e precauzioni, Tumori*.

Molto raramente l'anello di NuvaRing può rompersi. Per ulteriori informazioni, vedere paragrafo 3.4 *Cosa fare se...L'anello si rompe*.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite l'Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare NuvaRing e il NuvaRing Applicatore

Conservi NuvaRing fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Se viene a sapere che un bambino è stato esposto agli ormoni di NuvaRing, consulti il

medico.

Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità. Non usi NuvaRing se le è stato dispensato più di 4 mesi prima. La data di dispensazione è riportata sulla scatola e sulla bustina dell'anello.

Non usi NuvaRing dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sulla bustina.

Non usi NuvaRing se nota cambiamenti di colore dell'anello o qualsiasi altro segno visibile di deterioramento.

Smaltisca l'anello usato insieme ai normali rifiuti domestici, preferibilmente riposto nella bustina richiudibile. Smaltisca l'applicatore usato in un normale contenitore per rifiuti. Non getti NuvaRing o l'applicatore nel water. Come con altri medicinali, non getti anelli non usati o scaduti nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare gli anelli non usati che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene NuvaRing

- I principi attivi sono: etonogestrel (11,7 mg) ed etinilestradiolo (2,7 mg)
- Gli altri componenti sono: copolimeri di etilene vinilacetato (28% e 9% vinilacetato) (un tipo di plastica che non si scioglie nel corpo) e magnesio stearato.

Etonogestrel ed etinilestradiolo sono rilasciati dall'anello in quantità giornaliera rispettivamente di 0,120 mg/die e 0,015 mg/die, per un periodo di 3 settimane.

Descrizione dell'aspetto di NuvaRing e di NuvaRing Applicatore e contenuto della confezione

NuvaRing è un anello flessibile, trasparente, incolore o quasi incolore, di diametro di 54 mm. Ogni anello è confezionato in una bustina di alluminio richiudibile.

L'applicatore è un dispositivo in plastica, non sterile, monouso (cioè, usa e getta). Ogni applicatore è confezionato singolarmente. L'applicatore ha un marchio CE impresso in rilievo sul dispositivo.

La(e) bustina(e) dell'(degli) anello(i) e l'(gli) applicatore(i) sono confezionati in una scatola di cartone insieme a questo foglio illustrativo.

Ciascuna scatola contiene 1 oppure 3 anelli e gli applicatori.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio nel paese di origine e Produttore

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio nel paese di origine:

Organon Portugal, Sociedade Unipessoal Lda.
Rua Alexandre Herculano, 50 – Piso 9 1250-011 Lisboa, Portogallo

Produttore:

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss,
Paesi Bassi

Importatore parallelo in Italia:

Farmed S.r.l. - Via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli - Italia

Riconfezionato nell'officina indicata dall'ultima lettera accanto al numero di lotto:

⑧ De Salute S.r.l. - Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR)

⑨ GXO Logistics Pharma ITALY S.p.A. - Via Amendola, 1

20049 Caleppio di Settala (MI)

⑩ Falorni S.r.l. - Via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito (Irlanda del Nord) con la seguente denominazione:

NuvaRing

0,120 mg/0,015 mg ogni 24 ore, dispositivo vaginale

Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Romania, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito (Irlanda del Nord).

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 06/2024.

NUVARING® è un marchio registrato del gruppo di società Organon